

## Lower end block

In overleg met uw behandelend arts is een lower end block (intrathecale neurolyse) afgesproken. Deze blokkade is een behandeling bij ernstige pijn gelokaliseerd rondom de anus of de uitwendige geslachtsdelen ten gevolge van kanker.

We streven ernaar u zo snel mogelijk te behandelen. Dit betekent dat u geholpen kunt worden door een andere specialist dan u op de polikliniek heeft gezien. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan aangeven.

### Vorbereidingen

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig. U mag tevoren gewoon eten en drinken. U gaat niet onder narcose.

### Hoe gaat het in zijn werk?

U krijgt een afspraak mee met datum en tijdstip waarop u wordt verwacht bij de receptie van het pijncentrum. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u begeleid naar de behandelkamer. Tijdens de behandeling zit u op de behandeltafel met uw benen over de rand. De arts brengt een naald in de rug, ter hoogte van de onderste lendenwervel. De met hersenvocht gevulde ruimte wordt aangeprikt. Vervolgens wordt er fenol (neurolytische vloeistof) bij de onderste zenuwwortels ingespoten om deze te blokkeren. Hierdoor kunnen de pijnprikkels minder goed worden doorgegeven en zal de pijn afnemen. Na de behandeling moet u nog enkele uren in halfzittende houding blijven zitten en blijft u minimaal nog 1 nacht in het ziekenhuis ter observatie.

### Allergieën

Als u allergisch bent voor medicijnen moet u dit ons voor de ingreep melden.

### Bloedverduuners

Als u bloedverduuners gebruikt moet u met de inname hiervan voor de behandeling stoppen, met uitzondering van acetylsalicylzuur. Het aantal dagen dat u met de inname van de bloedverduuners moet stoppen, hoort u van uw behandelend arts of bespreekt u met de trombosedienst.

### Bijwerkingen

Na de behandeling kunt u napijn hebben. Deze napijn kan 1 tot 2 weken aanhouden, maar verdwijnt vanzelf. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol. Zoals bij iedere behandeling bestaat er een kleine kans op complicaties:

- een bloeding;
- een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts;
- incontinentie voor urine en/of ontlasting;
- gevoelsvermindering of juist overgevoeligheid van de benen en/of het zitvlak;
- spierzwakte in de benen.

### Let op

Na de behandeling moet u nog enkele uren in halfzittende houding blijven zitten en blijft u minimaal nog 1 nacht in het ziekenhuis ter observatie.

## Resultaat

Het resultaat is pas na één of twee dagen te beoordelen. Meestal is er een duidelijke pijnvermindering. Dit effect houdt enige maanden aan. Zo nodig kan de behandeling herhaald worden. In veel gevallen zal de pijnmedicatie die vooraf gebruikt werd, na de behandeling kunnen worden afgebouwd.

## Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Pijncentrum.

## Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis): (013) 221 00 00

Locatie ETZ TweeSteden

Pijncentrum: (013) 221 04 10

Route 90

[pijn@etz.nl](mailto:pijn@etz.nl)