

Mammamarker plaatsen

Uw aanvragend arts heeft een onderzoek aangevraagd om een marker in de borst te plaatsen. Bij dit onderzoek wordt een marker in de borst gebracht als plaatsbepaling van een tumor of ander afwijking. Afhankelijk van de zichtbaarheid van de afwijking in uw borst wordt dit onder echo- of röntgengeleide gedaan.

Onder echogeleide betekent dat met behulp van een echografie de juiste plaats in de borst of oksel wordt bepaald waar de afwijking zich bevindt. Een echografie is een onderzoek waarbij door middel van geluidsgolven het weefsel in de borst kan worden afgebeeld. De geluidsgolven worden uitgezonden met behulp van een zogeheten transducer (=echokop), die over uw huid wordt bewogen. De geluidsgolven weerkaatsen verschillen in dichtheid van het weefsel. Deze worden door de transducer opgevangen en vervolgens door een computer in beelden omgezet. De geluidsgolven zijn niet schadelijk. Ook wanneer u zwanger bent, kunt u een echografie laten maken.

Onder röntgengeleide betekent dat met behulp van een röntgenfoto de juiste plaats in de borst wordt bepaald waar de afwijking zich bevindt.

De informatie in deze folder is algemeen. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle mogelijkheden te vermelden. Ook risico's en bijwerkingen zijn in algemene zin beschreven.

Een radioloog verricht de marker plaatsing, geassisteerd door een medisch assistent of laborant.

Waar vindt de ingreep plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie op **Locatie ETZ Elisabeth**, route 72. U wordt verzocht zich te melden bij de balie van de afdeling Radiologie.

Belangrijk om te weten vóór de ingreep

Vorbereiding

U mag voor het onderzoek geen gebruik maken van zalf, poeder of lotion op uw bovenlichaam. U mag wel deodorant gebruiken.

Medicijnen

Als u bloedverdünnende medicijnen gebruikt, heeft uw aanvragend arts aangegeven of en hoe u moet stoppen met de inname van bloedverdünnende medicijnen. Is dit voor u niet duidelijk, overleg dan met deze arts. Als u bij de Trombosedienst bekend bent, geef dan tijdig bij hen aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat. Als u andere medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.

Melden

Wij vinden het belangrijk dat u vooraf aan het onderzoek de assistente meldt als u overgevoelig bent voor verdovingsmiddel of pleisters.

Kleding

Voor het onderzoek is het nodig dat u de bovenkleding uittrekt.

Hoe verloopt het onderzoek?

U wordt ontvangen en begeleid door de medisch assistent of laborant. In de onderzoekskamer vraagt hij/zij u om op de onderzoekstafel plaats te nemen. De assistent of de radioloog legt u nog eens in het kort uit wat er tijdens het onderzoek gaat gebeuren. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Wanneer de radioloog de afwijking zichtbaar heeft gemaakt, desinfecteert hij/zij de huid bij de plaats van de punctie en geeft vervolgens hierin een verdovingsprik. Hierna maakt de radioloog een klein sneetje in de huid. De radioloog brengt de naald in de borst. Via de naald wordt de marker ingebracht. Wanneer de marker op de juiste plaats zit, wordt de naald verwijderd. De marker is van Titanium en kan zonder bijwerkingen in de borst of oksel achterblijven. De assistente plakt de punctieplaats af. Hierna wordt ter controle een röntgenfoto op het mammografie-apparaat gemaakt. Wanneer de marker op de juiste plaats zit, mag u de afdeling verlaten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u naar huis. Het advies is om het wondje 24 uur droog te houden, daarna kunt u weer douchen. Beter is om enkele dagen niet in bad te gaan of te zwemmen, dit om het wondje goed te laten genezen. De pleister, die door de laborant op de punctieplaats is aangebracht, kunt u na een paar uur al verwijderen. Soms wordt er een klein hechtpleistertje gebruikt, deze mag u laten zitten en valt er na een paar dagen vanzelf af. Het is mogelijk dat u een bloeduitstorting krijgt na het onderzoek. Dit is helaas niet te voorkomen. Wanneer de verdoving is uitgewerkt en er pijnklachten optreden, kunt u een paracetamol innemen (voor gebruik; zie bijsluiter).

Risico's, complicaties en bijwerkingen bij deze ingreep

Elke ingreep kent risico's, bijwerkingen en/of complicaties. Zoals bij elke prik kan er een bloeding optreden. Dit is meestal tijdens de procedure zelf. Het gevolg is dan vaak een pijnlijke blauwe plek en eventueel een gezwollen borst.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie.

Tot slot

Als u na het lezen van de brochure nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Aan het beging van de ingreep vertelt de assistent of radioloog u nog een keer wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):	(013) 221 00 00
Radiologie: (08:30 - 17:00 uur)	(013) 221 03 70
Mammacare: (08:30 - 17:00 uur)	(013) 221 01 30