

Neusprovocatie

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Neusprovocatietest

Neusprovocatietest

Het doel van de neusprovocatietest is een indruk te krijgen van de reactie van het neusslijmvlies op het betreffende allergeen. De test kan ook worden uitgevoerd met een algemeen irriterende stof (histamine) om een niet-allergische ofwel specifieke prikkelbaarheid vast te kunnen stellen.

Vorbereiding

Medicatie



Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van anti-allergische medicijnen, tabletten, oogdruppels en neusspray, (ten minste) 4 dagen voor de test stopt.

Meer informatie over: Medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van anti-allergische medicijnen, tabletten, oogdruppels en neusspray, (tenminste) 4 dagen voor de test stopt.

Gebruikt u Bètablokkers of antidepressiva? Klik dan op de onderstaande button voor belangrijke informatie.

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie. Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (bijvoorbeeld koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de test door kan gaan.

Bètablokkers



Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogboldruk) en heeft u dit nog niet besproken met uw behandeld Allergoloog? Dan

dient u voor de test contact op te nemen met de polikliniek Allergologie. Deze middelen kunnen namelijk een allergische reacties versterken en vormen daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg).

Anti-allergische medicatie



Zie afbeelding voor overzicht van anti-allergische medicatie. Daarnaast dient u tenminste 1 week voor de test te stoppen met anti-allergische Neussprays zoals: Otrivin neusallergie, allergodil, Dymista, Livicab.

Allergocrom comod, Lomusol, Otrivin hooikoorts, Prevalin, Vividrin.

tenminste 24 uur stop met Nasivin, Vicks Sinex, Otrivin neusverkoudheid, Otrivin menthol

Tenminste 10 dagen stop met neussprays als Beconase, Rhinocort, Syntaris, Flixonase, Demysta, Nasonex en Nasacort.

Let op!

Als u astma hebt, is het van belang dat de neusprovocatie gebeurt op een moment dat de astmaklachten goed onder controle zijn. Het is daarom belangrijk dat, als u inhalatiemedicatie voor de longen (pufjes/discus/turbuhaler die u via de mond inhaleert) gebruikt, u voorafgaand aan de test deze gewoon door gebruikt.

De neus dient in de voor u/uw kind gebruikelijke toestand te zijn. Dit betekent dat u beter tevoren telefonisch kunt overleggen bij een griep, verkoudheid of een geïrriteerde neus.

Goed om te weten!



Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten. U mag een half uur voor de test niet eten of drinken.

Meer informatie over: Goed om te weten!

Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten. U mag een half uur voor de test niet eten of drinken.

Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (bijvoorbeeld koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de test door kan gaan.

Uitvoering

Waar mag u zich melden?



U mag zich op de afgesproken tijd melden op locatie ETZ Elisabeth, het Allergiecentrum route 35.

Let op: u moet minimaal 30 minuten van te voren aanwezig zijn in verband met de

temperatuurwisseling van buiten naar binnen.

Verloop neusprovocatietest

U krijgt een sponsje met slangetje in de neus en een neus/mondkapje aangesloten op een drukmeter. Tijdens de test wordt eerst gekeken naar de doorgankelijkheid van de neus. Vervolgens krijgt u/uw kind sprays in de neus toegediend waarop op een aantal manieren gereageerd kan worden:

- **niezen;**
- **loopneus;**
- **slijm in de keel;**
- **tranende en/of jeukende ogen;**
- **een vol gevoel in het hoofd;**
- **een drukkend gevoel in het voorhoofd.**

Meer informatie over: Verloop neusprovocatietest

U krijgt een sponsje met slangetje in de neus en een neus/mondkapje aangesloten op een drukmeter. Tijdens de test wordt eerst gekeken naar de doorgankelijkheid van de neus. Vervolgens krijgt u/uw kind sprays in de neus toegediend waarop op een aantal manieren gereageerd kan worden:

- niezen;
- loopneus;
- slijm in de keel;
- tranende en/of jeukende ogen;
- een vol gevoel in het hoofd;
- een drukkend gevoel in het voorhoofd.

Als u/uw kind gaat niezen tijdens de test, moet u het aantal keren dat geniest wordt tellen. Tijdens de test mag de neus niet 'opgehaald of gesnoten worden'. De neus mag wel gedept worden met een tissue (tissues bewaren om te tellen of te wegen). De assistente geeft u een lijst (de zogenaamde Lebel-score) waar u, op verschillende momenten tijdens de test, de aard en de ernst van de klachten kunt invullen. Tevens zal de doorgankelijkheid van de neus opnieuw gemeten worden.

Het aantal sprays dat toegediend wordt, is afhankelijk van de reactie van de neus; hoe gevoeliger het neusslijmvlies, hoe eerder de neus reageert waarbij de test gestaakt wordt.

De sprays worden toegediend met een aantal minuten tussenpauze, afhankelijk van de soort vloeistof.

Bijwerkingen

De neusprovocatietest is een veilige test. Natuurlijk kunt u klachten verwachten, zoals niesbuien, jeuk in neus en ogen, neusverstopping, een loopneus en een drukkend gevoel in de neusbijholten. Meestal verdwijnen deze symptomen snel. Zelden treedt er een astma en/of algemene allergische reactie op waarbij uw arts direct hulp kan bieden.

Meer informatie over: Bijwerkingen

De neusprovocatietest is een veilige test. Natuurlijk kunt u klachten verwachten, zoals niesbuien, jeuk in neus en ogen, neusverstopping, een loopneus en een drukkend gevoel in de neusbijholten. Meestal verdwijnen deze symptomen snel. Zelden treedt er een astma en/of algemene allergische reactie op waarbij uw arts direct hulp kan bieden.

Als er na langere tijd ernstige allergische klachten (bijvoorbeeld kortademigheid enkele uren na de test) zijn ontstaan, moet u direct contact opnemen met uw arts (via het Allergiecentrum (tijdens kantooruren) of buiten kantooruren met het algemeen nummer ETZ zodat zij u kunnen doorverbinden met de dienstdoende allergoloog of de Spoedeisende Hulp.

Na de neusprovocatietest

Na de test

Vanwege dit risico is het van belang dat u/uw kind na de test altijd nog 15 minuten blijft wachten. Voelt u/uw kind zich na dit kwartier goed en hebt u geen verdere afspraken dan kunt u vervolgens naar huis.

Contact

Contact



Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.

ETZ Elisabeth

Direct nummer

(013) 221 00 20

Openingstijden

ma t/m vrij 8.30-17.00

Route

35

Alle informatie

Bijwerkingen

De neusprovocatietest is een veilige test. Natuurlijk kunt u klachten verwachten, zoals niesbuien, jeuk in neus en ogen, neusverstopping, een loopneus en een drukkend gevoel in de neusbijholten. Meestal verdwijnen deze symptomen snel. Zelden treedt er een astma en/of algemene allergische reactie op waarbij uw arts direct hulp kan bieden.

Als er na langere tijd ernstige allergische klachten (bijvoorbeeld kortademigheid enkele uren na de test) zijn ontstaan, moet u direct contact opnemen met uw arts (via het Allergiecentrum (tijdens kantooruren) of buiten kantooruren met het algemeen nummer ETZ zodat zij u kunnen doorverbinden met de

dienstdoende allergoloog of de Spoedeisende Hulp.

Goed om te weten!

Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten. U mag een half uur voor de test niet eten of drinken.

Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (bijvoorbeeld koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de test door kan gaan.

Verloop neusprovocatietest

U krijgt een sponsje met slangetje in de neus en een neus/mondkapje aangesloten op een drukmeter. Tijdens de test wordt eerst gekeken naar de doorgankelijkheid van de neus. Vervolgens krijgt u/uw kind sprays in de neus toegediend waarop op een aantal manieren gereageerd kan worden:

- niezen;
- loopneus;
- slijm in de keel;
- tranende en/of jeukende ogen;
- een vol gevoel in het hoofd;
- een drukkend gevoel in het voorhoofd.

Als u/uw kind gaat niezen tijdens de test, moet u het aantal keren dat geniest wordt tellen. Tijdens de test mag de neus niet 'opgehaald of gesnoten worden'. De neus mag wel gedept worden met een tissue (tissues bewaren om te tellen of te wegen). De assistente geeft u een lijst (de zogenaamde Lebel-score) waar u, op verschillende momenten tijdens de test, de aard en de ernst van de klachten kunt invullen. Tevens zal de doorgankelijkheid van de neus opnieuw gemeten worden.

Het aantal sprays dat toegediend wordt, is afhankelijk van de reactie van de neus; hoe gevoeliger het neusslijmvlies, hoe eerder de neus reageert waarbij de test gestaakt wordt.

De sprays worden toegediend met een aantal minuten tussenpauze, afhankelijk van de soort vloeistof.

Medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van anti-allergische medicijnen, tabletten, oogdruppels en neusspray, (tenminste) 4 dagen voor de test stopt.

Gebruikt u Bètablokkers of antidepressiva? Klik dan op de onderstaande button voor belangrijke informatie.

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva

gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie. Als u zwanger bent, of wanneer de conditie van u/uw kind is verslechterd (bijvoorbeeld koorts, kortademigheid of hartklachten) raden wij u aan van te voren contact op te nemen met ons om te beoordelen of de test door kan gaan.

Bètablokkers

Bètablokkers

Indien u/uw kind zogenaamde Bètablokkers tabletten/oogdruppels gebruikt, dient u vooraf contact met de polikliniek Allergologie op te nemen.

Tabletten

Algemene naam	Merknaam
Acebutolol	Sectral [°]
Atenolol	Tenormin [°]
Atenolol/chloortalidon	Tenoretic [°]
Atenolol/nifedipine	Niften [°]
Betaxolol	Kerlon [°]
Bisoprolol	Emcor [°]
Bisoprolol/hydrochloorthiazide	Emcoretic [°]
Carvedilol	Eucardic [°]
Celiprolol	Dilanorm [°]
Esmolol	Brevibloc [°]
Labetalol	Trandate [°]
Metoprolol	Lopresor [°] , Selokeen [°]
Metoprolol/hydrochloorthiazide	Selokomb [°]
Nebivolol	Nebilet [°]
Oxprenolol	
Pindolol	Viskeen [°]
Propranolol	Inderal [°]
Sotalol	Sotacor [°]

Oogdruppels

Algemene naam:	Merknaam
Betaxolol	Betoptic [°]
Bimatoprost/timolol	Ganfort [°]
Brimonidine/timolol	Combigan [°]
Carteolol	Teoptic [°] , Arteoptic [°] , Carteabak [°]
Dorzolamide/timolol	Cosopt [°]
Latanoprost/timolol	Xalacom [°]
Levobunolol	Betagan liquifilm [°]
Metipranolol	Beta Ophtiole [°] (EDO)
Metipranolol/pilocarpine	Normoglaucan [°]
Pilocarpine/timolol	Timpilo [°]
Timolol	Loptomit [°] , Nyogel [°] , Timo-COMOD [°] , Timoptol [°]
Travoprost/timolol	Duotran [°]

Gebruikt u/uw kind Bètablokkers tabletten (voorgeschreven voor onder andere hartaandoeningen, hoge bloeddruk of migraine) of Bètablokkers oogdruppels (voorgeschreven voor hoge oogboldruk) en heeft u dit

nog niet besproken met uw behandeld Allergoloog? Dan dient u voor de test contact op te nemen met de polikliniek Allergologie. Deze middelen kunnen namelijk een allergische reacties versterken en vormen daarom een risico op eventuele gevaarlijke reacties. De noodzaak van de test wordt heroverwogen en er wordt eventueel overlegd met uw behandelend arts of met de inname van deze medicatie tijdelijk gestopt kan worden (Nb. niet stoppen zonder overleg).

Anti-allergische medicatie

Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex ^o
Alimemazine	Nedeltran ^o
Cetirizine	Zyrtec ^o , Reactine ^o , Revalintabs ^o
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour ^o
Cimetidine	Tagamet ^o
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil ^o
Cromoglicinezuur	Nalcrom ^o
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin ^o
Desloratadine	Aerius ^o
Dexchlorfeniramine	Polaramine ^o
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil ^o
Ebastine	Kestine ^o
Famotidine	Pepcid ^o , Pepcidin ^o
Fexofenadine	
Guaifenesine/natriumbenzoaat/oxomemazine	Toplexil ^o
Hydroxyzine	Atarax ^o
Ketotifen	Zaditen ^o
Levocetirizine	Xyzal ^o
Loratadine	Allerfre ^o , Claritine ^o
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal ^o
Meclozine/pyridoxine	Emesafene ^o
Mizolastine	Mizollen ^o
Montelukast	Singulair ^o
Nizatidine	Axid ^o
Oxatomide	Tinset ^o
Oxomemazine	Toplexil ^o
Promethazine	
Ranitidine	Zantac ^o
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid ^o
Terfenadine	Triludan ^o

Zie afbeelding voor overzicht van anti-allergische medicatie. Daarnaast dient u tenminste 1 week voor de test te stoppen met antiallergische Neussprays zoals: Otrivin neusallergie, allergodil, Dymista, Livicab, Allergocrom comod, Lomusol, Otrivin hooikoorts, Prevalin, Vividrin.
tenminste 24 uur stop met Nasivin, Vicks Sinex, Otrivin neusverkoudheid, Otrivin menthol
Tenminste 10 dagen stop met neussprays als Beconase, Rhinocort, Syntaris, Flixonase, Demysta, Nasonex en Nascort.

Contactgegevens

Allergiecentrum

013-2210020

Website

<https://www.etz.nl/Specialisme/Allergiecentrum>

Versie 202103091355