

Orthoptie

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Orthoptie	1
Wat doet een orthoptist?	1
Met welke klachten kunt u bij de orthoptist terecht?	1
Hoe lang duurt een behandeling?	2
Vergoeding	2
Belangrijke telefoonnummers	3

Orthoptie

Orthoptie wil zeggen 'recht kijken'. Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Door een rechte oogstand, kunnen beide ogen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of de oogstand, wordt een orthoptist ingeschakeld. In deze folder wordt uitgelegd wat een orthoptist doet en wat hij/zij voor u kan doen.

Wat doet een orthoptist?

Een orthoptist onderzoekt de oogstand, de samenwerking tussen de ogen en de ontwikkeling van het zien. Als er afwijkingen worden geconstateerd, stelt de orthoptist, indien mogelijk, een behandeling in. De ontwikkeling van het zien vindt in de eerste 8 á 12 levensjaren plaats. Afwijkingen kunnen dan ook in deze jaren ontstaan. De samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. Vroegtijdig opsporen is van groot belang. Wanneer de oorzaak van de klachten op het terrein van een ander specialisme ligt, adviseert de orthoptist de oogarts verdere verwijzing.

Met welke klachten kunt u bij de orthoptist terecht?

De orthoptist onderzoekt en behandelt onder andere:

- scheelzien
- een lui oog
- dubbelzien
- hoofdpijn
- leesklachten.

Scheelzien

Scheelzien kan verschillende oorzaken hebben. De orthoptist onderzoekt dit en bepaalt welke behandeling het meest geschikt is. De behandeling kan bestaan uit het voorschrijven van een bril, maar in een aantal gevallen is het nodig het scheelzien te verhelpen door een operatie. De orthoptist overlegt dan met de oogarts die de operatie uitvoert.

Een lui oog

Als er sprake is van scheelzien of een verschil in brilsterkte tussen de ogen, wordt één van de ogen niet (voldoende) gebruikt. Daardoor ontwikkelt de gezichtsscherpte van dat oog zich niet goed. We noemen dit een lui oog. Een lui oog kan alleen verholpen worden als het op tijd wordt behandeld. Dit betekent soms al in het eerste levensjaar! De meest voorkomende behandeling bestaat uit het afplakken van het 'goede' oog, vaak in combinatie met het voorschrijven van een bril.

Dubbelzien

Dubbelzien kan ontstaan doordat één of meerdere oogspieren en/of oogzenuwen niet goed functioneren. Dit kan veroorzaakt worden door bepaalde ziektes, zoals bijvoorbeeld suikerziekte of schildklierproblemen. De orthoptist onderzoekt welke spier of welke groep spieren niet goed functioneert. Deze informatie is belangrijk voor eventueel verder onderzoek of verdere verwijzing. Soms wordt dubbelzien veroorzaakt door een verminderde samenwerking tussen de ogen. De orthoptist kan oefeningen of speciale brilcorrecties voorschrijven. Naast eventueel andere specialistische hulp blijft de patiënt meestal onder controle van de orthoptist.

Hoofdpijn/leesklachten

Door een verminderde samenwerking tussen de ogen kunnen hoofdpijn en/of leesklachten ontstaan. De orthoptist onderzoekt en behandelt ook eventuele stoornissen op dit gebied. Afhankelijk van de oorzaak kunnen oefeningen en speciale brilcorrecties deze klachten vaak verhelpen. Soms is een oogspieroperatie nodig.

Hoe lang duurt een behandeling?

De duur van een behandeling verschilt sterk per klacht of afwijking. In veel gevallen kan de orthoptist niet aangeven hoe lang een behandeling duurt, omdat het verloop van de behandeling door veel factoren wordt beïnvloed. Controles blijven na de behandeling een aantal jaren noodzakelijk.

Vergoeding

Orthoptische zorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 22 100 00
Polikliniek Oogheelkunde: (013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28

Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B

Locatie ETZ Waalwijk
Route 43

Zie ook: Website: www.orthoptisten.info

Oogheelkunde, 42.393 04-20

Copyright® ETZ
Afdeling Communicatie
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

