

Röntgenonderzoek van de slokdarm en de slikbeweging bij kinderen (slikvideo)

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Waar vindt het onderzoek plaats?	1
Wat is belangrijk om te weten voor het onderzoek?	1
Hoe verloopt het onderzoek?	2
Wat moet u doen als u weer thuis bent?	2
Hoe komt u aan de uitslag?	2
Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?	2
Risico's en/of bijwerkingen	3
Tot slot	3
Belangrijke telefoonnummers	3

Uw kind krijgt binnenkort een onderzoek van de slokdarm en de slikbeweging. Bij dit onderzoek worden de slikbeweging zichtbaar gemaakt op een monitor. In deze folder staat welke voorbereiding daar voor nodig is. Tevens vindt u in deze folder informatie over het verloop van het onderzoek.

Daar waar hij staat geschreven, kan ook zij gelezen worden.

Waar vindt het onderzoek plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het ETZ op locatie ETZ Elisabeth. Deze afdeling bevindt zich op de begane grond in route 72. U meldt zich voor uw afspraak bij de balie. Voordat u zich kunt melden is het noodzakelijk een nummertje te trekken bij de zuil bij de ingang van de wachtruimte.

Wat is belangrijk om te weten voor het onderzoek?

Vorbereiding

- Probeer uw kind op het onderzoek voor te bereiden. Als uw kind weet wat er gaat gebeuren, kan hij beter meewerken.
- Breng eventueel een vertrouwd speeltje of een knuffel mee.
- Uw kind kan tijdens het onderzoek een luier of onderbroek aanhouden. Kies verder voor kleding die gemakkelijk zit.
- Het is het beste als uw kind twee à drie uur voor het onderzoek niets heeft gegeten en weinig heeft gedronken.
- Breng een eigen fles, beker of lepel mee.
- Breng voeding van uw kind mee waarbij de slikklachten optreden en ook voeding waarbij geen slikklachten zijn.
- Een van de ouders/verzorgers is bij het onderzoek aanwezig en helpt bij het eten geven.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, kan hij deze normaal blijven innemen.

Melden

Als u als ouder/verzorger zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, wilt u dit dan vóór het onderzoek aan de laborant(e) meedelen? Röntgenstralen kunnen namelijk schadelijk zijn tijdens de eerste weken van de zwangerschap.

Kleding

Tijdens het onderzoek mag uw kind zijn kleding gewoon aanhouden. In de bovenkleding mogen geen knoopjes of ritsen zitten.

Hoe verloopt het onderzoek?

De contrastvloeistof

Tijdens het onderzoek wordt naast röntgenstraling een contrastmiddel gebruikt. Dit middel zorgt er voor dat de slokdarm en de slikbeweging op de röntgenopname te zien zijn. De radioloog kan kiezen uit waterige contrastvloeistof of witte bariumpap. De keuze wordt bepaald op de dag van het onderzoek en is (onder andere) afhankelijk van de reden voor het onderzoek. De contrastvloeistof of de bariumpap wordt gemengd met de voeding van uw kind. Alle soorten voeding is dus mogelijk, van vloeibaar tot grof (bijvoorbeeld brood).

De röntgenfoto's

Nadat u zich bij de balie heeft gemeld, neemt de radiodiagnostisch laborant u en uw kind mee naar de onderzoekkamer. Bij het onderzoek zijn een radioloog, radiodiagnostisch laborant en indien nodig een logopedist aanwezig.

Uw kind drinkt of eet tijdens het maken van de foto's de meegebrachte voeding. Uw kind zit tijdens het onderzoek in een stoel.

Er worden meerdere röntgenopnames gemaakt. Het onderzoek duurt ongeveer 45 tot 60 minuten.

Wat moet u doen als u weer thuis bent?

Na het onderzoek moet u uw kind veel laten drinken. Op deze manier verlaat de contrastvloeistof het lichaam makkelijker.

Hoe komt u aan de uitslag?

Een radioloog bekijkt de foto's, eventueel samen met de logopedist, en maakt een schriftelijk verslag van het onderzoek. Bij uw behandelend arts kunt u terecht voor de uitslag. Indien van toepassing geeft de logopedist adviezen.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling Radiologie. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden. Als u wilt, kunt u meteen een nieuwe afspraak maken.

Risico's en/of bijwerkingen

Bij gebruik van bariumpap kan de ontlasting de volgende dag een beetje wit gekleurd zijn. Waterige contrastvloeistof is plakkerig. Dit merkt u als uw kind spuugt. Verder heeft uw kind geen last van de contrastmiddelen.

Van dit onderzoek zijn géén risico's en/of bijwerkingen bekend.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Aan het begin van het onderzoek vertelt de laborant(e) u nog een keer wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Radiologie: (013) 221 03 70

Locatie ETZ Elisabeth
Route 72

Locatie ETZ TweeSteden
Route 77

Locatie ETZ Waalwijk
Richting 35

Radiologie, 42.474 09-18

[↑ terug naar de inhoudsopgave](#)

