

Druppelonderzoek bij kinderen met Atropine[®] oogdruppels

Inhoudsopgave

Klik op het onderwerp om verder te lezen.

Werking van de druppels	1
Het onderzoek	2
Belangrijk	2
Heeft u nog vragen?	2
Belangrijke telefoonnummers	2

Uw kind is door de orthoptist onderzocht en uw kind krijgt een druppelonderzoek met Atropine[®] 0,5% oogdruppels. Door middel van een druppelonderzoek wordt de sterkte van de ogen bepaald. Het vermogen van de ooglenzen om scherp te stellen (accommodatie) wordt hierdoor uitgeschakeld. Dit is nodig omdat de accommodatie van de lens de sterkte van het oog, en dus de meting, kan beïnvloeden.

Werking van de druppels

Als de druppels goed ingewerkt zijn, is de pupil groot. Uw kind kan hierdoor last hebben van licht en wazig zien. Een zonnebril en/of petje kan een oplossing zijn. De wijde pupil en dus de overgevoeligheid voor licht verdwijnt langzaam na het stoppen met het druppelen, maar kan nog twee weken aanhouden.

Het druppelen gaat als volgt:

- voor het druppelen de handen wassen;
- zet het druppelflesje klaar, samen met wat gaasjes/tissues;
- leg uw kind op de rug;
- neem het druppelflesje in de ene hand;
- houd met duim en wijsvinger van de andere hand de oogleden van één oog open;
- laat 1 druppel in het geopende oog vallen;
- laat de oogleden los en veeg met het gaasje het gesloten oog af;
- druppel hierna op dezelfde wijze het andere oog;
- was na het druppelen uw handen.

Op welke dagen moet er gedruppeld worden?

U moet twee dagen voor het onderzoek beginnen met het druppelen van de ogen.

Bijvoorbeeld: als uw kind op maandag moet komen voor het meten van de oogsterkte:

- zaterdag twee maal daags druppelen ('s ochtends en 's avonds in beide ogen één druppel)
- zondag twee maal daags druppelen ('s ochtends en 's avonds in beide ogen één druppel)
- op de dag van het onderzoek (in dit voorbeeld maandag) 's morgens in beide ogen één druppel.

In totaal vijf druppels per oog.

Het onderzoek

Het onderzoek voor het bepalen van de oogsterkte duurt ongeveer tien minuten. Het onderzoek is eenvoudig en pijnloos. Uw kind mag, als het dat wil, op schoot zitten bij één van de ouders/verzorgers. De orthoptist bepaalt de sterkte van de ogen met behulp van een computer of houdt enkele glaasjes voor het oog en kijkt met een lampje. De uitslag krijgt u direct na het onderzoek.

Belangrijk

- Het flesje Atropine[®] oogdruppels altijd buiten het bereik van kinderen houden. De druppels zijn bij **inname via de mond ZEER giftig!** Mocht dit toch gebeuren, neem dan direct contact op met de huisarts.
- Als uw kind een hartafwijking heeft, druppel dan niet en neem contact op met de polikliniek oogheelkunde.
- Overgevoeligheid voor de druppels treedt zelden op. Als een kind onverhoopt toch overgevoelig is voor de druppels, dan kunnen de volgende reacties optreden: koorts, sufheid, braken, rode uitslag in het gezicht of op de armen, diarree en een droge mond (veel willen drinken). Als één van deze symptomen optreedt, stop dan met druppelen en neem contact op met de huisarts. Daarnaast wordt u verzocht om de polikliniek oogheelkunde in te lichten dat uw kind vanwege overgevoeligheid niet alle druppels heeft gekregen. De afspraak kan dan worden aangepast.
- Na de laatste keer druppelen kunt u het flesje het beste terugbrengen naar de apotheek, zodat het veilig vernietigd kan worden.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u op werkdagen contact opnemen met uw orthoptist via de polikliniek oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):	(013) 221 00 00
Polikliniek Oogheelkunde:	(013) 221 03 20

Locatie ETZ Elisabeth
Route 28

Locatie ETZ TweeSteden
Route 1B

Oogheelkunde, 43.300 04-20

Copyright[®] ETZ
Afdeling Communicatie

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.