

## Shunt; Emla<sup>®</sup> zalf, instructies voor het gebruik

Emla<sup>®</sup> zalf is een zalf die ervoor zorgt dat de huid waar aangeprikt wordt, verdoofd is.

### Instructievoor het gebruik

- U mag de Emla<sup>®</sup> zalf één uur voordat u aangeprikt gaat worden aanbrengen (bijvoorbeeld voor u in de taxi stapt).
- De bedoeling is dat u op de shunt, op de door de verpleegkundige afgesproken plaatsen, de Emla<sup>®</sup> zalf aanbrengt.
- Gebruik een flinke hoeveelheid (dot), dit is twee centimeter zalf per prikplaats.
- U moet de zalf aanbrengen en niet inwrijven.
- Dek daarna de hoeveelheid zalf af met huishoudfolie. Deze zorgt ervoor dat de zalf op zijn plaats blijft zitten.
- Probeer alleen de shunt te bedekken en zo min mogelijk de huid naast de shunt.

### Complicaties

Het kan gebeuren dat uw huid geïrriteerd raakt door de Emla<sup>®</sup> zalf. Laat dit altijd aan de verpleegkundige weten. Er wordt dan uitgezocht waar de irritatie precies vandaan komt. Als de irritatie toeneemt, kan het zijn dat het gebruik van de Emla<sup>®</sup> zalf gestaakt moet worden. Er kan dan de verdovende spray Xylocaine<sup>®</sup> gebruikt worden. Een enkele keer kunnen er toch nog pijnklachten zijn, ondanks het gebruik van Emla<sup>®</sup> zalf of Xylocaine<sup>®</sup> spray.

### Tot slot

Hebt u na het lezen van deze instructie nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Dialyse.

### Belangrijke telefoonnummers

**ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):** (013) 221 00 00

**Locatie ETZ Elisabeth  
Afdeling Dialyse:  
Route 10** (013) 221 29 10

**Locatie Dialyse Waalwijk  
Eerste etage:  
Gezondheidscentrum Het Koetshuis** (013) 221 1293