

Sulfasalazine

Salazopyrine EC®

Reumatologie

In overleg met u heeft uw behandelend arts u het geneesmiddel sulfasalazine voorgeschreven. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw arts, verpleegkundig specialist, apotheker of verpleegkundig reumaconsulent terecht.

Werking

Sulfasalazine (ook wel SASP genoemd) is een antireumaticum. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling en pijn van de gewrichten en bovendien ochtendstijfheid. SASP heeft ook een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen. SASP werkt langzaam. Het kan vier tot tien weken duren voor het effect merkbaar wordt. Uw arts adviseert u dan ook meestal om naast SASP, tijdelijk andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik

SASP wordt toegediend in tabletten van 500 mg. Er wordt meestal een opbouwschema gebruikt. Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken, dient u de tabletten tijdens de maaltijd in te nemen. U moet de tabletten in hun geheel doorslikken.

Bijwerkingen

- misselijkheid, duizeligheid en/of hoofdpijn
- huiduitslag of geelzucht
- pijnlijk mondslijmvlies, zweertjes in de mond
- blauwe plekken
- depressieve gevoelens
- koorts
- afwijkingen in het bloed zoals bloedarmoede en leverfunctiestoornissen

Als één of meerdere van deze verschijnselen bij u optreden, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of huisarts. Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdige tekenen van beenmergbeschadiging of leverfunctiestoornissen worden opgespoord en kan eventueel de dosis SASP worden aangepast. U moet u daarom goed aan de afspraak voor bloedcontrole houden.

Aanvullende informatie

SASP kan uw urine oranje-rood kleuren. U hoeft u hierover geen zorgen te maken. Dit verdwijnt weer na stopzetten van de medicatie. SASP werd in de jaren veertig oorspronkelijk ontwikkeld als geneesmiddel tegen reumatoïde artritis en chronische darmontstekingen. Het is echter vooral bekend geworden als medicijn tegen ontstekingen van de dikke darm, waar voor het al tientallen jaren op grote schaal wordt gebruikt

Invloed op een zwangerschap en borstvoeding

Overleg altijd met uw behandelend arts als u een zwangerschap overweegt. SASP kan indien nodig, op voorschrift van uw behandelend arts, tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt. Foliumzuurgebruik wordt al aangeraden voor de conceptie en zwangerschap, mogelijk in een hogere dosering dan gebruikelijk. Uw behandelend arts kan u hierin adviseren. NB: Voor mannen die SASP gebruiken: SASP kan bij mannen tijdelijk verminderde vruchtbaarheid veroorzaken. Dit verdwijnt na stopzetten van de medicatie.

Indien u meer informatie wilt over het medicijn sulfasalazine verwijzen wij u naar de onderstaande link van ReumaNederland.

[Folder sulfasalazine](#)

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u altijd bij uw arts, apotheker, verpleegkundig specialist of verpleegkundig reumaconsulent terecht.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00
Polikliniek Reumatologie: (013) 221 03 80

ETZ Elisabeth
Route 24
Locatie ETZ TweeSteden
Afdeling 3A