

Poliklinische behandeling peritonsilair abces

U heeft onlangs een bezoek gebracht bij polikliniek KNO.

De KNO-arts heeft u behandeld in verband met een peritonsilair abces (pusophoping achter de keelamandel).

Leefregels

- Gebruik de antibiotica en eventuele ontstekingsremmer volgens voorschrift van de dokter.
- Gebruik pijnstilling in de vorm van paracetamol en ibuprofen op gezette tijden.
- Probeer vooral goed te blijven drinken.
- Twee dagen na behandeling middels ontlasting van het peritonsilair abces wordt door de poli KNO contact met u opgenomen om te horen of de behandeling aan begint te slaan.
- Het duurt 48 uur voordat het antibioticum begint te werken.
- Als u binnen 48 uur toenemende klachten krijgt van kortademigheid of een onvermogen om de nek te draaien moet u contact opnemen met de polikliniek KNO onder werktijden of de SEH in de avond of in het weekend.

Aanvullende informatie

Ga naar www.kno.nl of meteen naar [amandelen volwassenen](#) Onder het kopje peritonsillair abces

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):	(013) 221 00 00
Polikliniek KNO:	(013) 221 02 30
OK planners KNO:	(013) 221 21 16

Locatie ETZ Elisabeth Route 4

Locatie ETZ Waalwijk Wachtruimte 3, Nummer 9