

Mycofenolaatmofetil

U heeft in overleg met uw behandelend specialist besloten, dat u het medicijn Mycofenolaatmofetil gaat gebruiken in verband met een interstitiële longaandoening. Deze folder geeft u informatie over dit medicijn.

Het doel van de behandeling met mycofenolaatmofetil is de ontstekingsactiviteit van uw ziekte te onderdrukken. U kunt zelf een actieve bijdrage leveren aan een veilig en verantwoord medicatiegebruik, leest u deze informatie daarom zorgvuldig.

Mycofenolaatmofetil behoort tot de groep van de zogenaamde immunosuppressiva (medicijnen die de afweer onderdrukken). Door het afweersysteem te onderdrukken remt het ontstekingen.

De duur van de behandeling kan variëren en hangt af van het resultaat. Meestal wordt er gestart met een lage dosering en wordt de dosering verhoogd, na bloedonderzoek en afhankelijk van hoe u het middel verdraagt. Afhankelijk van de ziekteactiviteit en/of het optreden van eventuele bijwerkingen, kan de dosering van Mycofenolaatmofetil verlaagd of verhoogd worden.

Gebruik

Een tablet of capsule bevat 250 of 500 mg mycofenolaatmofetil. U moet de tabletten/capsules geheel door slikken, dus u mag ze niet fijnmaken of erop kauwen. Neem altijd rond dezelfde tijd in. Het is belangrijk dit middel consequent om de 12 uur (dus tweemaal daags) in te nemen. Innemen kan zowel met als zonder voedsel, maar wissel dit liever niet af. De hoeveelheid werkzame stof die uit de darm in uw bloed terecht komt, is afhankelijk van voedselinname. Daarom neemt u het middel steeds op dezelfde manier in, dus met of zonder voedsel (bij slikproblemen is Mycofenolaatmofetil tevens beschikbaar als drank).

Bijwerkingen

Het gebruik van Mycofenolaatmofetil kan leiden tot een aantal bijwerkingen. In de bijsluiter staan alle bijwerkingen die ooit gemeld zijn. Hieronder staan de meest voorkomende.

- Maag en darmklachten zoals buikpijn, misselijkheid, braken of diarree.
- Stoornissen in de bloedaanmaak door onderdrukking van het beenmerg. Dit kan zich uiten in bloedarmoede, infecties, het spontaan ontstaan van blauwe plekken of bloedneuzen.
- Irritatie van de lever (stijging van leverenzymen in het bloed).
- Griepachtige verschijnselen.

Neem contact op met uw longarts of ILD-verpleegkundige als u last hebt van koorts (<38.5) of als een andere bijwerking langer aan blijft houden.

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

- Mycofenolaatmofetil mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
- Vrouwen moeten minimaal zes weken voor een eventuele zwangerschap stoppen met het gebruik van Mycofenolaatmofetil
- Tijdens de behandeling met Mycofenolaatmofetil mag u geen borstvoeding geven.
- Overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan eerst met uw longarts.
- Mycofenolaatmofetil leidt niet tot onvruchtbaarheid, als u klaar bent met de kuur, heeft u dus net zo veel kans om kinderen te kunnen krijgen als er voor.

Bloedonderzoek

Tijdens de behandeling met Mycophenolaatmotefil wordt erbij u regelmatig bloed afgenomen voor controle. Hierdoor kunnen eventuele tekenen van lever- of nierfunctiestoornissen of stoornissen in de bloedaanmaak vroegtijdig worden opgespoord. Houdt u zich daarom goed aan de afspraken voor bloedafname.

Aandachtspunten

Alcohol

Het gebruik van alcohol wordt ontraden. In combinatie met Mycophenolaatmotefil is de kans groter dat u leverfunctiestoornissen krijgt. Overleg het gebruik van alcohol met uw longarts.

Vaccinaties

De griepvaccinatie (griep prik) is aan te raden. Omdat Mycophenolaatmotefil uw afweer onderdrukt bent u mogelijk gevoeliger voor complicaties van griep (influenza). Een griepvaccinatie kan u tegen griep beschermen. We adviseren om overige vaccinaties met uw huisarts of longarts te overleggen.

Zon

Beperk blootstelling van de huid aan zonlicht en UV-straling door het dragen van beschermende kleding en het gebruik van een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 20 of hoger).

Gebruik van Mycophenolaatmotefil samen met andere medicijnen

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. De apotheek controleert ook of u verschillende medicijnen bij elkaar mag gebruiken. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt; denk hierbij ook aan eventueel gebruik van zelfzorgmedicatie. Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de werkzaamheid van Mycophenolaatmotefil beïnvloeden en/of sommige bijwerkingen versterken.

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer: (013) 221 02 60. Of maak gebruik van het telefonisch spreekuur ILD op maandag en donderdag van 11.00 tot 12.00 op telefoonnummer: (013) 221 02 67.