

Het nemen van een biopt, verwijderen van een mucocèle en/of fibroom

U komt binnenkort op de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) voor het nemen van een biopt en/of verwijderen van een mucocèle en/of fibroom.

Bij het nemen van een biopt verwijdert de MKA-chirurg één of meerdere kleine stukjes weefsel voor microscopisch onderzoek. De MKA-chirurg kan ook een mucocèle verwijderen. Dit is een slijmcyte die ontstaat door een verstopt speekselklierje in de mond.

Een fibroom is een goedaardig gezwel en bestaat uit bindweefsel en komt vaak voor in de wang, op de zijkant of tongpunt en ziet eruit als een bultje. De grootte kan variëren.

De Behandeling

U krijgt een plaatselijke verdoving. Er worden meerdere stukjes weefsel uit uw mond verwijderd. De wondjes worden meestal met een oplosbare hechting gehecht. Na de behandeling, die ongeveer 20 min duurt, mag u naar huis. Het verwijderde weefsel wordt, indien nodig, opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek.

Indien nodig wordt er een vervolgspraak gepland om de uitslag te bespreken. Deze wordt meestal na twee weken besproken. In sommige gevallen wordt de uitslag telefonisch gegeven.

Na de behandeling

U hebt een plaatselijke verdoving gekregen. Deze verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Na de behandeling wordt er soms een gaasje op de wond gelegd. U moet een half uur het gaasje tegen de wond aandrukken om de kans op nabloeding te verkleinen.

Na het afnemen van de bipten kan uw tong, wang en/of lip gaan zwellen. Dit is een normaal gevolg. Om zwelling te beperken kunt u direct na thuiskomst een coldpack in een theedoek of washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang/lip houden. U kunt afwisselend 15 minuten wel en 15 minuten niet koelen. Koelen moet direct na de behandeling gebeuren, want na een dag is er geen effect meer te verwachten. De eerste 2 tot 3 dagen kunnen uw wang en/of lip gezwollen zijn. Na 7 tot 10 dagen is de zwelling meestal verdwenen.

Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijn hebben. U kunt daarvoor paracetamol innemen, volgens de op de verpakking aangegeven dosering.

U mag na het onderzoek gewoon eten en drinken, let er wel op dat u tijdens de werking van de verdoving geen warm eten of drinken inneemt. De eerste 24 uur na het onderzoek mag u niet roken en geen alcohol gebruiken. Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne belangrijk. U kunt uw tanden en kiezen gewoon poetsen, waarbij u wat voorzichtiger bent bij de wond. De eerste 24 uur mag u uw mond niet krachtig spoelen. De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen. De hechtingen lossen in ongeveer 1 tot 3 weken op.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

U moet contact opnemen met de polikliniek MKA als u last krijgt van:

- koorts boven 39°C;
- als de wond fors gaat bloeden;
- een forse toename van zwelling en slikklachten.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek MKA.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis):

(013) 221 00 00

Polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA):

(013) 221 02 20