

Laserbehandeling glaucoom

In overleg met uw oogarts heeft u voor een laserbehandeling gekozen. Een laserbehandeling kan voor verschillende oogaandoeningen noodzakelijk zijn. Voor de behandeling van (risico op) glaucoom zijn er twee soorten laser afhankelijk van het type glaucoom. Het doel van de behandeling niet het verbeteren van zien, maar het stoppen of vertragen van de (eventuele) schade die deze aandoeningen aan de oogzenuw brengt.

1. Bij een selectieve laserplastiek (slt) wordt het afvoersysteem van het oogvocht verbeterd, zodat de oogdruk lager wordt. Ook deze behandeling geeft geen verbetering van zien.
2. Bij een perifere iridotomie laser, worden er 2 klein gaatjes in de iris gemaakt, ten einde van de afvoer van kamerwater te garanderen. In deze folder leest u informatie over de voorbereiding en het verloop van de behandeling.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt plaats op de polikliniek Oogheelkunde op:

- ☐ locatie ETZ Elisabeth, route 28
- ☐ locatie ETZ TweeSteden, afdeling 1B

De behandeling

Bij het maken van de afspraak voor de laserbehandeling heeft u druppels meegekregen ter voorbereiding van de laserbehandeling. Met deze druppel(s) druppelt u een half uur en een kwartier van tevoren in het te behandelende oog/ogen waardoor uw pupil kleiner wordt. Op de polikliniek zelf krijgt u nog een voorbereidende druppel om de oogbol te verdoven. Als de laserbehandeling plaatsvindt zit u achter het laserapparaat met uw kin in een kinsteun, meestal wordt een contact glas op het oog geplaatst. Tijdens de behandeling kijkt u in een fel licht. Binnenin dit felle licht ziet u lichtflitsjes en hoort u piepjes. Dit zijn de laserstralen. Een slt behandeling is niet pijnlijk. Bij een laser voor een perifere iridotomie kan er wel enige pijn ervaren worden. Deze pijn varieert van een vaag prikkende gevoel tot milde pijn in het hoofd en hoofdpijn. De behandeling duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Na de behandeling kan het oog een beetje plakkerig aanvoelen. Dit komt door de contactgel die tijdens de laserbehandeling gebruikt is. Tevens kan u enkele uren na de behandeling verblind zijn en wazig zien. Voorkom dat u de eerste uren na de behandeling in uw oog wrijft. U kunt het veschadigen omdat uw oog door de druppels, die u voor de behandeling heeft gekregen verdoofd is. Mocht u hoofdpijn krijgen dan kunt u normale pijnstillers gebruiken, zoals paracetamol of asprine. Na de laserbehandeling wordt, indien noodzakelijk, een controle afspraak op de polikliniek gemaakt. U kunt de afspraak direct maken bij de balie. Hierna kunt u naar huis. Aangezien u door de druppels en de laserbehandeling de eerste uren na de behandeling wazig ziet, kunt u niet deelnemen aan het verkeer. Neem daarom iemand mee om u te begeleiden.



Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Oogheelkunde. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze voor de behandeling aan de oogarts stellen. U kunt ook contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Belangrijke telefoonnummers

ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis): (013) 221 00 00

Polikliniek Oogheelkunde: (013) 221 03 20

Locatie Elisabeth

Route 28

Locatie TweeSteden

Afdeling 1B